

2 Der Freie Fall

Ein quantenmechanisches Teilchen falle unter dem Einfluss der konstanten Gravitationskraft auf die Erde. Der Abstand über der Erdoberfläche sei x . Das Potential lautet dann

$$V(x) = \begin{cases} mgx & \text{für } x \geq 0, \\ \infty & \text{für } x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

und der Hamiltonoperator ist somit

$$H = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad .$$

In der Ortsdarstellung lautet der Hamiltonoperator

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \quad .$$

Da das Potential für $x < 0$ unendlich ist, muss die Wellenfunktion dort identisch Null sein

$$\Psi(x) = 0 \quad \text{für } x < 0 \quad .$$

Da die Wellenfunktion stetig und normierbar sein muss, haben wir für den Bereich über der Erdoberfläche ($x \geq 0$) die Randbedingungen

$$\Psi(0) = 0 \quad (2a)$$

$$\Psi(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \quad . \quad (2b)$$

Im Bereich $x \geq 0$ lautet die zeitabhängig Schrödingergleichung somit

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi(x, t)}{dx^2} + mgx \Psi(x, t) = i\hbar \frac{d}{dt} \Psi(x, t) \quad .$$

Es ist immer sinnvoll, insbesondere bei der numerischen Behandlung, dimensionslose Größen einzuführen, um die typische Zeit-, Längen und Energieskala des Problems zu erhalten. In diesen *natürlichen Einheiten* sind alle Größen von der Ordnung $O(1)$. Wir setzen an

$$x = x_0 \xi \quad (3)$$

$$t = t_0 \tau \quad (4)$$

$$\Psi(x, t) = \Psi(x_0 \xi, t_0 \tau) =: \Phi(\xi, \tau) \quad . \quad (5)$$

Damit wird die Schrödingergleichung zu

$$-\frac{\hbar^2}{2mx_0^2} \frac{d^2 \Phi(\xi, \tau)}{d\xi^2} + mgx_0 \xi \Phi(\xi, \tau) = i \frac{\hbar}{t_0} \frac{d}{d\tau} \Phi(\xi, \tau) \quad (6)$$

$$-\underbrace{\frac{\hbar^2}{2m^2 g x_0^3}}_{P_1} \frac{d^2 \Phi(\xi, \tau)}{d\xi^2} + \xi \Phi(\xi, \tau) = i \underbrace{\frac{\hbar}{t_0 m g x_0}}_{P_2} \frac{d}{d\tau} \Phi(\xi, \tau) \quad . \quad (7)$$

Nun können wir x_0 und t_0 so wählen, dass die beiden Parameterkombinationen P_1, P_2 beide zu Eins werden, d.h.

$$x_0 = \left(\frac{\hbar^2}{2m^2g} \right)^{1/3} \quad (8)$$

$$t_0 = \frac{\hbar}{mgx_0} \quad . \quad (9)$$

In den natürlichen Einheiten wird die Schrödingergleichung zu

$$-\frac{d^2\Phi(\xi, \tau)}{d\xi^2} + \xi\Phi(\xi, \tau) = i\frac{d}{d\tau}\Phi(\xi, \tau) \quad .$$

Welche Werte nehmen die natürlichen Einheiten für makroskopische Teilchen an? Wir wählen $m = 1kg$. Zur Erinnerung, das Plancksche Wirkungsquantum beträgt $\hbar = 1.05 \times 10^{-34}Js$ und die Fallbeschleunigung ist $g = 9.81m/sec^2$. Damit erhalten wir

$$x_0 = 8.28 \times 10^{-24}m$$

$$t_0 = 1.30 \times 10^{-12}sec \quad .$$

Mit dem Ansatz für die stationäre Lösung

$$\Phi(\xi, \tau) = \phi(\xi) e^{i\tau\varepsilon}$$

erhalten wir die zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$-\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + \xi\phi(\xi) = \varepsilon\phi(\xi) \quad .$$

Aus dem Vergleich des Phasenfaktors (im Zeitentwicklungsoperator) vor und nach der Einführung der natürlichen Einheiten

$$\frac{t}{\hbar}E = \frac{t_0\tau}{\hbar}E \stackrel{!}{=} \tau\varepsilon$$

$$E = \frac{\hbar}{t_0}\varepsilon$$

erhalten wir auch die natürliche Einheit der Energie

$$E_0 = \frac{\hbar}{t_0} = mgx_0 \quad , \quad (10)$$

also gerade die potentielle Energie, die zu x_0 gehört. Die zeitunabhängige Schrödingergleichung kann auch in die Gestalt

$$-\frac{d^2\phi(\xi)}{d\xi^2} + (\xi - \varepsilon)\phi(\xi) = 0$$

gebracht werden. Wenn wir die neue Variable $z = \xi - \varepsilon$ einführen erhalten wir schließlich

$$-\frac{d^2 \tilde{\phi}(z)}{dz^2} + z \tilde{\phi}(z) = 0$$

$$\tilde{\phi}(z) := \phi(\xi - \varepsilon) \quad .$$

Bestimmen Sie mit Mathematica die beiden linear unabhängigen Lösungen und ermitteln Sie aus dem Verhalten dieser Lösungen für $z \rightarrow \infty$, welche Lösung physikalisch zulässig ist.

Die beiden Lösungen, sind die Airy-Funktionen Ai und Bi, wobei die letztere mit $z \rightarrow \infty$ divergiert und somit wegen (2b) keiner physikalische Lösung entspricht. Es bleibt also

$$\tilde{\phi}(z) = C \text{Ai}(z) .$$

Die uns interessierende Lösung in ξ ist demnach

$$\phi(\xi) = C \text{Ai}(\xi - \varepsilon) .$$

- **Ermitteln Sie aus der Randbedingung $\phi(\xi = 0) = 0$ die Energieeigenwerte ε_ν .**
- **Verifizieren Sie, dass die Lösung $\tilde{\phi}(z)$ für negative z sehr gut durch die Funktion**

$$\sqrt{\frac{1}{3\pi}} \cos\left(\frac{2}{3}(-z)^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

approximiert wird.

- **Wie lauten die Energieeigenwerte ε_ν , wenn man diese Näherungslösung verwendet.**
- **Wie lauten die exakten Eigenfunktionen $\phi_\nu(\xi)$?**

Nun muss nach (2a) $\phi(0) = 0$ gelten , d.h. $\text{Ai}(-\varepsilon) = 0$. Somit bestimmen die Nullstellen ξ_ν der Airy-Funktion die Eigenwerte des Hamiltonoperators

$$E_\nu = -E_0 \xi_\nu \quad \nu = 1, 2, \dots$$

Die Airy-Funktion hat nur Nullstellen bei negativen Werten, d.h. die Energie-Eigenwerte sind positiv, wie es aufgrund allgemeiner Überlegungen auch sein muss.

Die Nullstellen sind näherungsweise gegeben durch

$$\left((2n - \frac{1}{2}) \frac{3\pi}{4} \right)^{2/3}$$

Die Energie-Eigenfunktionen sind als

$$\Phi_\nu(\xi) = \frac{1}{Z_\nu} \text{Ai}(\xi - \xi_\nu) \quad (11)$$

$$Z_\nu = \int_0^\infty |\text{Ai}(\xi - \xi_\nu)|^2 d\xi \quad (12)$$

$$= \int_{-\xi_\nu}^\infty |\text{Ai}(\xi)|^2 d\xi \quad , \quad (13)$$

wobei Z_ν die Normierung der Funktion darstellt.